



SULFAPOT 360

ÎNGRĂȘĂMÂNT ANORGANIC LICHID COMPUS CU MACROELEMENTE - CFP 1 (C)(I)b(ii)

Conținutul în nutrienți menționați ca procente masa/ volum (w/v%)

36,8% Oxid de potasiu (K_2O) (=30,6% K) hidrosolubil

61,7% Trioxid de sulf (SO_3) (=24,7% S) hidrosolubil

Ingrediente:

CMC 1 (substanțe și amestecuri din materiale virgine):

Tiosulfat de potasiu (nr. CAS 10294-66-3)

Instrucțiuni și doze de aplicare

- Aplicare foliară: 2-3 l/ha, 2-3 tratamente pe sezon. Concentrația recomandată 0,8%
- Aplicare radiculară: 5-8 l/ha, 2-3 tratamente pe sezon. Concentrația maximă recomandată 10%
- Legume (tomate, ardei, morcov, pătrunjel, țelină, vinete, conopidă, varză) : 1,5- 2.0 L/ha. Se efectuează 1-2 tratamente în a doua parte a perioadei de vegetație, când fructele se apropie de dimensiunea normală. Intervalul între aplicări este de 10-15 zile.
- Pepeni verzi, pepeni galbeni : 1,5 -2,0 L/ha, când fructele se apropie de dimensiunea normală.
- Pomi fructiferi (măr, prun, cais, piersic, cireș) : 1,5 -2,0 L/ha. Se fac două aplicări când fructele se apropie de dimensiunea normală, dar înainte ca fructele să înceapă să se coloreze.
- Vița de vie (soiuri de masă și soiuri pentru vinificație) : 2,0-3,0 litri/ha. Se efectuează 2-3 aplicări, începând cu faza în care boabele sunt de dimensiunea bobului de mazăre.
- Cartof : 2,0-2,5 L/ha. Se efectuează două aplicări: prima, la începutul formării tuberculilor iar următoarea la interval de 15 zile.
- Cereale paioase : 1.5-2.5 L/ha, în faza de burduf.

Dozele de aplicare sunt oferite cu titlu de recomandare. Agricultorilor li se recomandă să solicite consiliere din partea consilierului lor pentru a adapta recomandările la situația lor specifică și pentru a evita fertilizarea excesivă.

A se utiliza doar în caz de necesitate recunoscută. A nu se depăși doza de aplicare.

Evitați pulverizarea la lumina puternică a soarelui, sau la temperaturi ridicate.

Dacă este posibil, aplicați seara sau dimineața devreme, mai ales dacă temperaturile depășesc 25°C.

Umpleți rezervorul de pulverizare cu jumătate din cantitatea necesară de apă și începeți să agitați bine recipientul.

Adăugați cantitatea necesară din produs, apoi adăugați restul de apă.

Conditii de depozitare recomandate:

- A se depozita produsul într-un spațiu uscat și bine ventilat, ferit de îngheț și de lumina directă a soarelui.
- Temperatura de depozitare 5-35°C.
- Produsul poate fi stivuit
- Consultați și informațiile din fișa cu date referitoare la siguranță (MSDS) pusă la dispoziție.

Informatii privind siguranta si mediul:

Atentie!



UFI: N910-J0V6-K00F-RFOC

H315 Provoacă iritarea pielii.

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P264 Spălați-vă mâinile și părțile expuse ale corpului bine după utilizare.

P280 Purtați mănuși de protecție.

P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P337+P313 Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.

Informatii generale:

Destinat pentru:

- Uz profesional

Cantitate neta: €

Informatii suplimentare:

Sarac in clor

Continut mic de cadmiu

Ingrasamantul este in solutie.

pH – 8,1

Densitate – 1,47 g/mL

Nu se recomanda depasirea dozelor de aplicare.

In cazul aplicarii impreuna cu produse de protectia plantelor si/sau alti fertilizanti, se recomanda efectuarea unui test de compatibilitate in prealabil. Iar pentru verificarea eventualelor fitotoxicitati ale amestecului se recomanda efectuarea unui tratament pe o suprafata mica de proba.

Date de contact ale producatorului:

AGRO-EST MUNTENIA SRL

Cioranca 131, Cioranca, 127381

România

RO26121880

0338 130 300

vanzari@agroest.ro

www.agroest.ro